

攻下药练习题

1.) 1.大黄与芒硝配伍, 应属于哪种配伍关系()

- A.相须     B.相使     C.相畏     D.相杀

2.) 2.火升血溢, 吐血、衄血, 大便燥结, 首选: ()

- A.黄芩     B.大黄     C.石膏     D.知母

3.) 3.治温热病高热神昏, 烦躁, 大便秘结, 首选: ()

- A.黄芩     B.大黄     C.石膏     D.知母

4.) 4.治火热上炎、迫血妄行所致的吐血、咯血、衄血, 最宜选用()

- A.大黄     B.芦荟     C.火麻仁     D.芒硝

5.) 5.易引起继发性便秘的药物是()

- A.番泻叶     B.芒硝     C.火麻仁     D.大黄

6.) 6.以下何药最常用治烧烫伤的治疗()

- A.番泻叶     B.芒硝     C.火麻仁     D.大黄

7.) 7.治腹内瘀血积块以及妇女瘀血之月经不调、痛经、产后腹痛等, 宜选用()

- A.大黄     B.芦荟     C.火麻仁     D.芒硝

8.) 8.治湿热黄疸, 以上何药最宜与茵陈、栀子同用()

- A.番泻叶     B.芒硝     C.火麻仁     D.大黄

9.) 9.大黄用于攻下, 以下用法哪项是正确的()

- A.炒炭入药     B.酒蒸或酒炒入药     C.入汤剂后下微煎     D.入汤剂先下久煎

10.) 10.大黄用治瘀血证, 以下用法哪项是正确的()

- A.炒炭入药     B.酒炙入药     C.生用     D.入汤剂后下微煎

11.) 11.长于软化坚硬燥结之大便，为“咸能软能下”的代表药物是()

- A.番泻叶     B.芒硝     C.火麻仁     D.大黄

12.) 12.局部外用，治咽喉肿痛，口舌生疮，目赤红肿等，最常选用()

- A.番泻叶     B.芒硝     C.火麻仁     D.芦荟

13.) 13.无引起继发性便秘之弊病，且临床上多用于习惯性便秘及清洁肠道的药物是()

- A.番泻叶     B.芒硝     C.大黄     D.芦荟

14.) 14.芦荟不宜入煎剂是因为()

- A.有效成分不溶于水     B.有效成分难溶于水     C.有效成分受热易破坏     D.味极苦且气臭难服

15.) 15.肝热烦躁，失眠，热结便秘，首选()

- A.番泻叶     B.芒硝     C.大黄     D.芦荟

16.) 16.能利水退肿的药物是()

- A.番泻叶     B.郁李仁     C.芒硝     D.芦荟

17.) 17.外用可清热解毒，杀虫止痒的泻下药是()

- A.番泻叶     B.郁李仁     C.芒硝     D.芦荟

18.) 18.既能泻下积滞，又可清泻肝热的药物是()

- A.番泻叶     B.郁李仁     C.芒硝     D.芦荟

19.) 19.以下何药逐水退肿泻饮作用最强，而副作用相对较小()

- A.甘遂     B.京大戟     C.芫花     D.大黄

20.) 20.以下哪项不是牵牛子的功效()

- A.泻下逐水     B.利尿     C.驱蛔虫     D.祛痰止咳

21.) 21.以下何药可煎服()

A.甘遂     B.京大戟     C.商陆     D.巴豆

22.) 22.肠胃湿热积滞，泻而不爽，或腹痛便秘，以下何药最宜()

A.甘遂     B.京大戟     C.牵牛子     D.商陆

23.) 23.能驱蛔虫的药物是()

A.甘遂     B.京大戟     C.牵牛子     D.商陆

24.) 24.甘遂用于逐水退肿泻饮，以下用法及使用注意哪项不宜()

A.孕妇及虚证忌用     B.不宜与甘草同用     C.入丸散剂     D.入汤剂后下微煎

25.) 25.以下哪项不是牵牛子的功效()

A.泻下逐水     B.利尿     C.驱蛔虫     D.消疮肿

26.) 26.药性辛热，有大毒的泻下逐水药为()

A.甘遂     B.京大戟     C.牵牛子     D.巴豆

27.) 27.治寒积便秘之急重症，突发心腹胀痛，其痛如锥刺，大便不通，甚则气急口噤，以下何药最宜()

A.甘遂     B.京大戟     C.牵牛子     D.巴豆

28.) 28.以下哪项不是巴豆的功效()

A.攻下冷积     B.逐水消肿     C.破血消瘀     D.祛痰利咽

29.) 29.使用巴豆，以下哪项是不正确的()

A.孕妇及虚证忌用     B.不宜与牵牛子同用     C.入丸散剂     D.入汤剂后下微煎

30.) 30.巴豆入丸散剂的每次服用量，以下哪项为宜()

A.0.1~0.3g     B.3~6g     C.6~9g     D.9~15g